

Beheer

Voor de instandhouding van een bloemrijke vegetatie is het van belang om deze goed te beheren. Maaien en afvoeren is dus van belang. Dit om de bodem te versralen. Het juiste maaitijdstip is afhankelijk van het doel. Daarnaast hangt het tijdstip en de frequentie van maaien af van de voedselrijkdom van de bodem. Over het algemeen dient er zeker de eerste jaren verschaald te worden.

Maaifrequentie:

Voor de ontworpen mengsels geven we het volgende maaiadvies:

- 1) DEN HAAG 1:
1-2 x per jaar maaien: in de nazomer of de herfst en eventueel in juni afhankelijk van ontwikkeling. Bij veel vergrassing en veronkruiding 2 keer maaien.
- 2) Den HAAG 2:
1 x per jaar maaien in de nazomer of de herfst
- 3) DEN HAAG 3:
1 x per jaar maaien in de nazomer of de herfst
- 4) DEN HAAG 4:
Dit mengsel kan op verschillende manieren worden beheerd. Als extensief gazon, iedere 3 – 6 weken maaien en afvoeren. Als de vegetatie hoger mag worden 1-3 keer per jaar maaien. (mei, augustus, oktober).
- 5) DEN HAAG 5:
1 x per jaar maaien in de nazomer of de herfst

Machines en gereedschappen

Het machinegebruik is afhankelijk van de bereikbaarheid en grootte van het te maaien oppervlak.

Kleine oppervlaktes of moeilijk bereikbare plekken: maai met een messenbalk of bosmaaier met slagmes. Het maaisel binnen enkele dagen afvoeren met een hooihark.

Grote oppervlaktes: maaien met een cyclomaaier en het maaisel binnen enkele dagen afvoeren met een hooihark/acrobat en balenpers. Werk hierbij in droge periodes om structuurbederf van de bodem te voorkomen. Een praktisch alternatief is de 'klepelmaaier met zuiginstallatie'. Dit werkt snel en daarmee kosten efficiënt. Ecologisch gezien is dit echter minder geschikt aangezien veel insecten en zaden worden meegezogen. Bij gebruik van deze machine is gefaseerd maaien vanuit ecologisch standpunt wenselijk.